



ProntechTM

STYMULATOR WZROSTU

PRONTECH STYMULATOR WZROSTU PRZEZNACZONY JEST DO STOSOWANIA W UPRAWIE ROŚLIN OZDOBNYCH W GRUNCIE I POD OSŁONAMI, W CELU STYMULACJI ICH WZROSTU ORAZ ZWIĘKSZENIA ŚWIEŻEJ I SUCHEJ MASY CZĘŚCI NADZIEMNYCH, UZYSKANIA KORZYSTNEGO POKROJU I ZWIĘKSZENIA RÓWNOMIERNOŚCI WZROSTU I KWITNIENIA ROŚLIN.

Zarejestrowany Decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nr Decyzji S-511/15, pozwolenie na wprowadzanie do obrotu organiczno-mineralnego stymulatora wzrostu Prontech.

INSTRUKCJA STOSOWANIA KWIATY

ZAKRES STOSOWANIA	TERMIN STOSOWANIA	LICZBA ZABIEGÓW	DAWKA
Rośliny ozdobne	Opryskiwać po sadzeniu i/lub w czasie wzrostu wegetatywnego	Wykonać 2-3 zabiegi, maksymalnie do 4 zabiegów, nie częściej, niż co 7-10 dni. Opryskiwać rośliny aż do całkowitego pokrycia cieczą użytkową powierzchni liści i pędów, lecz nie dopuścić do spływania cieczy. Stymulator wzrostu stosować na rośliny suche, zdrowe dobrze ukorzenione. Nie podlewać roślin w ciągu 24 godzin po wykonaniu zabiegu.	0,05%-0,15% (50g-150g stymulatora wzrostu w 100 litrach wody). Zaleca się 0,5g-1,0g/litr wody

Sporządzanie cieczy użytkowej: przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość stymulatora wzrostu wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, a następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Uwaga: stymulator wzrostu przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i plecakowych, mechanicznych.

Unikać nakładania się pasów opryskiwania, aby nie dopuścić do przedawkowania stymulatora wzrostu. Stymulator wzrostu nie jest przeznaczony do łącznego stosowania z środkami ochrony roślin.

Zawiera:

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkildimetylowe, chlorki

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Słukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich pojemników zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż kartę charakterystyki, lub opakowanie, lub etykietę. Zabezpieczyć przed przedostaniem się stymulatora wzrostu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby.

Przechowywanie: przechowywać z dala od źródeł ciepła, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 0°C do 30°C. Przechowywać pod zamknięciem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Szczegółowe informacje nt. środków ostrożności, środków pierwszej pomocy i inne zasady postępowania z produktem zawiera karta charakterystyki stymulatora wzrostu.

Stymulator wzrostu stosować po zapoznaniu się z kartą charakterystyki oraz z uwzględnieniem wymaganych środków bezpieczeństwa.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE	
Zawartość azotu całkowitego N	15%(m/m)
Zawartość węgla organicznego (C _{org})	35%(m/m)
Odczyn (pH w wodzie)	7-8
Postać	stały, granulowany

Podmiot odpowiedzialny:

Rolvet, ul. Nowotomyska 33, 64-310 Lwówek,
+48 602 510 498

Masa netto: 100g, 1kg

Okres trwałości: 3 lata od daty produkcji
Pozwolenie MRiRW nr S-511/15